

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE

**Informace pro nemocného, čtěte pozorně!**

### **ROWACHOL** **Perorální kapky, roztok**

#### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:**

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co. Cork, Irsko

#### **SLOŽENÍ:**

Perorální kapky, roztok

100 g roztoku obsahuje:

Léčivé látky

Pinenum $\alpha$	13,6 g
Pinenum $\beta$	3,4 g
Camphenum	5,0 g
Cineolum	2,0 g
Menthonum	6,0 g
Levomentholum	32,0 g
Borneolum	5,0 g

Pomocné látky: panenský olivový olej

1 ml roztoku odpovídá 26 kapkám

Perorální podání

#### **INDIKAČNÍ SKUPINA:**

Choleretika, cholekinetika

#### **CHARAKTERISTIKA:**

ROWACHOL zvyšuje vylučování žluče, uvolňuje křeče v oblasti žlučníku a žlučových cest, snížením městnání žluče zvyšuje látkovou výměnu v játrech. Omezuje tvorbu cholesterolu v játrech a zvyšování jeho koncentrace ve žluči. Tím přispívá k rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů a zabraňuje vzniku kamenů nových.

#### **INDIKACE:**

ROWACHOL se používá po poradě s lékařem k léčbě onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest, včetně rozpouštění žlučových kamenů. Může sloužit i jako pomocný lék při léčbě cukrovky.

#### **KONTRAINDIKACE:**

Nejsou známy. Přípravek by neměl být podáván ženám v prvních třech měsících těhotenství a po dobu kojení.

### **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:**

Přípravek je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou složku přípravku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

### **INTERAKCE:**

ROWACHOL může ovlivňovat účinek léků používaných ke snížení srážlivosti krve a léků metabolisovaných v játrech.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte ROWACHOL.

### **DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:**

Dospělí: Nedoporučí-li lékař jinak 4 až 5krát denně 3 až 5 kapek na kostku cukru nebo na suchar před jídlem.

Děti od 6 do 12 let: 3 až 4krát denně 1 až 2 kapky na kostku cukru, kousek piškotu nebo sucharu před jídlem.

### **UPOZORNĚNÍ:**

ROWACHOL je určen pouze k vnitřnímu užití. K přesnému odměření dávky použijte kapátko.

V případě předávkování kontaktujte lékaře.

### **UCHOVÁVÁNÍ:**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

### **VAROVÁNÍ:**

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

### **BALENÍ:**

10 ml

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE:** 2. 12. 2009