

Informace pro nemocného, čtěte pozorně!

ROWATINEX
Perorální kapky roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Irsko

SLOŽENÍ:

100 g roztoku obsahuje:

Léčivé látky

Pinenum α	24,8 g
Pinenum β	6,2 g
Camphenum	15,0 g
Cineolum	3,0 g
Fenchonum	4,0 g
Borneolum	10,0 g
Anetholum	4,0 g

Pomocné látky: Panenský olivový olej

1 ml roztoku odpovídá 26 kapkám

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Antiseptika, desinficiencia

CHARAKTERISTIKA:

ROWATINEX zvyšuje vylučování moče, zmírňuje křeče močových cest a umožňuje rozpad, rozpouštění a vyplavování ledvinových a močových kamenů. Je účinný při akutních a chronických zánětech močových cest a překrvením ledvin přispívá ke zvýšenému vylučování moči.

INDIKACE:

ROWATINEX se používá po poradě s lékařem k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Bez porady s lékařem je vhodný při ledvinových a močových kamenech, kdy napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.

KONTRAINDIKACE:

Nejsou známy. Přípravky by neměly být podávány ženám v prvních 3 měsících těhotenství a po dobu kojení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

ROWATINEX je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou jeho složku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce. Ve zcela ojedinělých případech byly popsány žaludeční obtíže a nevolnost. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

INTERAKCE:

ROWATINEX může ovlivňovat účinek léků používaných ke srážlivosti krve a léků, které jsou metabolizovány v játrech nebo v ledvinách.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte ROWATINEX.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nedoporučí-li lékař jinak:

Dospělí: 4 až 5krát denně 3 až 5 kapek na kostku cukru nebo kousek sucharu před jídlem.

Děti od 6 do 14 let: 3 až 4krát denně 1 až 2 kapky na kostku cukru, kousek sucharu nebo piškotu před jídlem.

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek ROWATINEX je určen pouze k vnitřnímu užití. K přesnému odměření dávky roztoku použijte vždy kapátko.

ROWATINEX není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, se zástavou močení a tvorby moči a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.

V případě předávkování kontaktujte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ:

Při teplotě do 25°C. Po každém použití lahvičku dobře uzavřete.

VAROVÁNÍ:

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

BALENÍ:

10 ml

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 2. 12. 2009