

Biocidní insekticid **Cytrol Forte** lze použít v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj.

Přípravek usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Vyniká dlouhou reziduální účinností - až 3 měsíce v závislosti na ošetřeném povrchu, neabsorbují se do něho a nezanechává skvrny. Hubí všechna pohybová stadia hmyzu.

Spolehlivě účinkuje i na štěnice a blechy: před použitím přípravku řádně důkladně vyluxujte a poté vystříkejte rámy a čela postelí, všechny škvíry, mezery, trhliny, potahy, nábytek, rámy dveří, závěsy apod. V případě blech pak ošetřít všechna místa, kde se zdržují domácí zvířata např. i spodní strany koberců, pelíšky aj.

DÁVKOVÁNÍ / ŘEDĚNÍ

Lezoucí a letající (odpočívající) hmyz, např. štěnice, blechy, švábi, mouchy, komáři, klíšťata, brouci aj.

Rutinní ošetření: 1 sáček na 5 litrů vody

Silné zamoření: 1 sáček na 2,5 litry vody

1 litr postřikové kapaliny vystačí na 20m² plochy. Aplikaci uvnitř objektu lze provést 1-2x měsíčně, venkovně 1-2x ročně (max. ošetřená plocha je 5 m²).

NÁVOD NA POUŽITÍ

Aplikační dávka je obsažena v 1 sáčku, který se ve vodě (ne příliš studené) rozpustí během 2-3 minut, poté protřepte. Prerušíte-li aplikaci, musí být postřiková kapalina opět důkladně promíchána, po dobu nejméně 30 sekund. Vždy vystříkejte celý obsah postřikové kapaliny.

- Vstup do místnosti až po úplném zaschnutí přípravku na ošetřených površích.
- Použijete-li pouze 1 sáček, druhý ponechte ve foliovém pytlíku, těsně jej uzavřete nebo sešijte např. pomocí kancelářské sešivačky.
- Nepoužívejte na zvířata!
- Nestříkejte na vodní plochy (např. akvária s rybami či jiným vodními živočichy).
- Zabraňte přístupu kočkám a dalším domácím mazlíčkům na ošetřená místa.
- Neaplikujte blízko elektrických spotřebičů, světelných zařízení nebo vypínačů.
- Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata při teplotě +5 až +30°C, pouze v originálním obalu.

UFI G090-104X-T00M-VDR7I

Hmotnost: 20 g



CYTROL FORTE

2 x 10 g

INSEKTICIDNÍ PRÁŠEK VE VODOROZPUSTNÝCH SÁČČÍCH



obrázky
© Josef Dvořák

Rychlá a bezpečná příprava postřikového roztoku

Účinná látka: cypermethrin (400 g v 1 kg přípravku)

NEBEZPEČÍ



Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Může způsobit poškození orgánů (nervový systém) při prodloužené nebo opakované expozici.

Vysoce toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje disodium maleate. Může vyvolat alergickou reakci.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Po manipulaci důkladně omyjte zasaženou kůži.

Uniklý produkt seberte.

Skladujte uzamčené.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TIS/lékaře.

Nevyvolávejte zvracení.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodoou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.

Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TIS/lékaře.

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě

tis@vfh.cz www.tis-cz.cz

DODAVATEL

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10

Telefon: 608 923 215, 602 219 959, 274 770 944

info@pelgar.cz / www.pelgar.cz



VÝROBCE

PelGar International Ltd. Newman Lane

Alton, Hampshire GU34 2QR, Velká Británie

www.pelgar.co.uk



Cytrol Forte je oznámen na MZd pod čj. 39171/2009-SOZ-33.5-27. 8. 2009

Cytrol je registrovanou obchodní známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.