

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

Energetická hodnota/Energy	na 100 ml mléka/mléčka
Tuky	285 kJ/68 kcal
3 tžob:	3,3g
nasytené/nasýtené mastné kyseliny	1,2g
polynenasýtené/polyunsaturated mastné kyseliny	0,9g
- kyselina arachidonová/ arachidonic (ARA)	8,5mg
- kyselina dokosahexaenová/ docosahexaenoic (DHA)	17mg
- kyselina linolová (LA)	427mg
- kyselina o-linolová/ o-linolenic (ALA)	51,0mg
Sacharidy	7,7g
3 tžob:	7,5g
ukry	7,5g
- laktóza	7,2g
polysacharidy/polysaccharides	0,8g
- inozitol/inositol	7,0mg
Vláknina	0,6g
3 tžob:	0,40g
glukosylsacharidy (GOS)	0,40g
fruktosylsacharidy (FOS)	0,08g
Bílkoviny/Belkoviny	1,5g
Vitamíny	60 µg
A	1,7 µg (24 %)*
D	1,2 µg 12 %*
E	4 µg 8 %*
K	4 µg 8 %*
C	9,9 mg (22 %)*
Thiamin/Thiamin (B ₁)	0,05 mg
Riboflavin/Riboflavin (B ₂)	0,10 mg
Niacin/Niacin (B ₃)	0,46 mg
B ₆	0,4 mg
Folát	16 µg
Kyselina listová	5,9 µg
B ₁₂	0,39 µg
Biotin/Biotin	0,4 µg
Kyselina pantotémová/pantothénová	1,8 µg
Magnézium/Magnesium	0,22 mg
Sodík	33,9 mg
Draslík	31 mg
Chlór	31 mg
Vápník/Calcium	73 mg
Fosfor	40 mg
Hořčík/Magnesium	7,2 mg
Železo	1 mg
Zinek/Zinc	0,5 mg
Měď/Copper	0,054 mg
Mangan/Manganese	0,005 mg
Fluorid/Fluoride	<0,004 mg
Selen/Selenium	3,9 µg
Jód	19 µg
Ostatní složky / Ostatní složky látky	
L-karnitin/L-carnitin	2 mg
Cholin/Choline	30 mg
Nulobsterin	2,4 mg
taurin/Taurin	5,1 mg
Ostatní/ostatní oligosacharidy GOS	0,7 g

*% referenční hodnoty dítěte / referenční příjmu

NUTRICIA

Nutrilon

PROSYNEO™

Speciálně vyvinutá receptura s naštěpenou bílkovinou

H.A.
-Hydrolysed Advance

SYNEO™
Bifidobakterie
Prebiotika GOS/FOS

Hydrolyzovaná bílkovina
Živiny na podporu imunitního systému
(Vitaminy C a D)*

2



**KOJENECKÉ MLÉKO
6 – 12 MĚSÍCŮ**

800g e

* Pokračovací mléčné kojenecké výživa, v prášku. / Mléčná dojívková mléčná výživa, v prášku. Vitaminy C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.

50 let
POKRŮČILÉMU
VÝŽIVNÉMU
MATEŘSKÉMU
MLÉKA

PRÁKTIČKÉ BALENÍ PRO VÁS / PRAKTIČKÉ BALENIE PRE VÁS



- Dvojité bezpečnostní pásky pro dokonalou uzavření a zachování čerstvosti před kontaminací v průběhu používání. / Dvojité bezpečnostní pásky pro dokonalé uzavření a zachování čerstvosti před kontaminací v průběhu používání.
- Zavazujeme při užívání před kontaminací v průběhu používání. / Zavazujeme při užívání před kontaminací v průběhu používání.
- Navyšeno tak, aby se mohl odvíjet rukou, když dítě mluví s druhým. / Navrhujeme tak, aby se mohl odvíjet rukou, když dítě mluví s druhým.
- Odměrka pro správné dávkování. / Odměrka na správné dávkování.
- Místo pro odměrku, aby měla odměrku vždy ve své ruce. / Místo pro odměrku, aby měla odměrku vždy ve své ruce.
- Místo pro odměrku, aby měla odměrku vždy ve své ruce. / Místo pro odměrku, aby měla odměrku vždy ve své ruce.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / ODPOVÍDÁJÍCÍ DÁVKOVÁNIE

Doporučené množství mléka denně je orientiční, řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením vašeho pediatra. Někdy nepodávajíte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno.

Věk dítěte / věk dieťaťa	Min. počet dávek / dávok za 24 h.	Příprava / príprava	Voda	Počet odměrek / odměrek prášku
6 – 8 měsíců/měsícov	5x 200 ml mléka/léčka z 24 h.	200 ml	100 ml	6
9 – 10 měsíců/měsícov	4x 200 ml mléka/léčka z 24 h.	250 ml	140 ml	8
11 – 12 měsíců/měsícov	3x 200 ml mléka/léčka z 24 h.	-	-	-

100 ml Nutrilon® Prosyneo™ 2 H.A. - Hydrolysed Advance = 90 ml převrácené / převrácenej vody + 3 zavržené odměrky / odměrky = 285 kJ (68 kcal). 1 zavržená odměrka / odměrka = 4,8 g suchého mléka / prášku. Používejte originální odměrku z výrobku / používejte originálnu odměrku.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU / NÁVOD NA PRÍPRAVU

Vystříkajte všechny použité odměrky a přepravte pilnou vodu do úst nebo do lžičky. Nechte ji v koupeli vychladnout až 59 minut na přibližně 40 °C. / Před začatím přípravy mléka Bifidobacterium breve dodržujte přípravné strážné teploty převarné vody do 40 °C. Odpovídající množství převarné vody (viz tabulka) vylejte do vyčištěné láhve.

Vystříkajte všetky použité odměrky a prepravte plnú vodu do úst alebo do lyžičky. Nechajte ju v kúpeli vychladnúť až 59 minút na približne 40 °C. / Před začatím přípravy mléka Bifidobacterium breve dodržujte přípravné strážné teploty převarné vody do 40 °C. Odpovídající množství převarné vody (počet tabulky) vylejte do vyčištěné láhve.

1. Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte.

2. Před podáváním převarte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním převarte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte.

3. Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte.

4. Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte.

DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNÍ / DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNIE

• Přípravenu stravu spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte. / Přípravenu stravu spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte.

• Nechíteve stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. / Nezhrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli opačeniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia.

• Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu mléčné výživy se zoubky – zvyšuje riziko výskytu zubního kazu. / Vyvarujte sa dlhodobému kontaktu mléčnej výživy so zubmi – zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte. / Před podáváním ověřte teplotu mléka kapáním na vnější stranu zápěstí a ihned podávejte.

Počátek života vašeho dítěte je výjimečné období.

Je krásné, občas nevyzpytatelné, ale především hečtické. Musíte se starat o vlnu věcí, a proto je důležitě mat se na koho obrátit. Jsme tu pro vás.

Vněujeme se odkrývání tajemství mateřského mléka, nejlepší výživy pro imunitu dítě. Vkládáme všechny naše znalosti do receptur podporujících imunitní systém* vašeho dítěte.



Začiatok života vášho bábätka je výnimočné obdobie.

Je krásne, občas nevyzpytatelné, ale hlavne hečtické. Musíte sa starať o veľa vecí, a preto je dôležité mať sa na koho obrátiť. My sme tu pre vás.

Venujeme sa odkrývaniu tajomstvá materského mléka, najlepšej výživy pre imunitu bábätka. Všetky naše znalosti vkládame do receptúr podporujúcich imunitný systém* vášho bábätka.

Nutrilon. PROSYNEO™ 2 H.A. - Hydrolysed Advance

ŠPECIÁLNĚ VYVINUTÁ RECEPTURA S NAŠTĚPENOU BÍLKOVINOU / DOJČENSKÉ MLÉKO 6 – 12 MĚSÍČÍ

Typ našich vědců vyvinul naši recepturu s mléčnou bílkovinou naštěpenou na menší části a Syneo™. Obsahuje také esenciální živiny včetně vitamínů přirozeně se vyskytujících v mateřském mléce.

Typ našich vědcov vyvinul našu receptúru s mléčnou bielkovinou naštěpenou na menšie časti a Syneo™. Obsahuje tiež esenciálne živiny vrátane vitamínov prirodzene sa vyskytujúcich v materskom mlieku.



SYNEO™

Bifidobakterie/Bifidobakterie (B. breve)
Bakterie přirozeně se nacházející ve střevě kojenců dítě / Bakterie prirodzene sa nachádzajúce v čreve dojčencov dieťa

Prebiotika GOS/FOS / Oligosacharidy GOS/FOS

Hydrolyzovaná bílkovina/bielkovina / Unikátní proteinová struktura citlivě naštěpená na malé části / Unikátna proteínová štruktúra citlivo naštěpená na malé časti

Živiny na podporu imunitního/imunitného systému
Vitamíny C a D* přispívají k normální funkci imunitního systému / Vitamíny C a D* prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému

SLOŽENÍ/ZLOZENIE

Laktóza (z mléka z mléka), hydrolyzovaná syrovátková bílkovina/vitálna bielkovina z mléka, mléčné tuky, rostlinné/rostlinné olej (kukurma) v vysokém obsahu kyseliny olejové/olejoviny v vysokém obsahu kyseliny olejové, kolosový, lepek/vitaminský, slanečnicový, šelakový, glukosylsacharidy z mléka z mléka, 3,2% emulgátor lecitínu - mono- a diglyceridy glycerolu mastných kyselín kyseliny L-kyselina citrónová/citronová, lecitín/lecitín, lososoban vepáný, thalokapsaktyrín 0,6 %, vým olej, hydrolyzovaný draselný, chlorid hydroxid/hydroxid, chlorid chlóru/chlorid, chlorid sodný, olej / Mlieko, laktóza, kyselina L-askorbová, chlorid draselný, inozitol/inositol, taurín/taurin, slan belychý, Bifidobacterium breve H-39, L-karnitin/L-carnitin, slan zavržený/zhrievaný, výživný, výživný 5 - monofosfát, sodný sáľ/sóľ urónu/urónu 5 - monofosfát, aniónový (polyoxy)palmitát, adenosín/adenozín 5 - monofosfát, sodný sáľ/sóľ inozitolu 5 - monofosfát, D-pantothén/pantothénové kyseliny, mliečnan/mliečnan, D, L - laktózy, sóľ, sodný sáľ/sóľ panoxylolpanoxylol 5 - monofosfát, slanečnicový/medový, D, L - askorbový, nelykvalín, thiamín/thiamín, thiamín/thiamín hydroxid, pyridoxyl/pyridoxyl hydroxid, soľ draselný, lepek, glycerol/glycerol, glycerol/glycerol, mono- a diglyceridy glycerolu mastných kyselín kyseliny, slanečnicový, sóľ sodný, tyrosol/tyrosol, cholesteról, D - biotín / B - biotín, tyrosol/tyrosol, tyrosol/tyrosol.

Důležité upozornění / Dôležité upozornenie

Kojení je nejdůležitější živinou kojenců. / Kojenie je najdôležitejšou živinou dojčencov.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

Podávejte doporučené množství / Podávajte odporúčané množstvo.

ROSTEME S VAŠIM DĚTÁTKEM

Od ukončeného 12. měsíce doporučujeme pokračovat s Nutrilon® PROSYNEO™ 3 H.A. - Hydrolysed Advance



POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? NAŠI ODPOVÍDAJÍCÍ JSOU TU PRO VÁS.

POTREBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVA? NAŠI ODPOVÍDAJÍCÍ SU TU PRE VÁS.

Nutrilon
Česká republika
Nutrilon
Slovenská republika

Nutrilibub
ČR 800 110 000
www.nutrilibub.cz
info@nutrilibub.cz
SR 0800 601 600
www.nutrilibub.sk
info@nutrilibub.sk



1049416
IE 1704 EC
010487-01-0005
CFAP
1703

Balení v ochranné atmosféře. Skladujte na suchém a chladném místě (max. do 25 °C, ne v lednici). / Balení v ochranné atmosfére. Skladujte na suchom a chladnom mieste (max. do 25 °C, nie v chladničke).

Minimální trvanlivost do: viz výše / Minimálna trvanlivosť do: pozrite výš

DANONE