

**Příbalová informace: informace pro pacienta  
Strepsils Mentol a Eukalyptus**

1,2 mg/ 0,6mg

pastilky

alcohol dichlorobenzyllicus/ amylmetakresolum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci:**

1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat
3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat
6. Obsah balení a další informace

**1. Co je Strepsils Mentol a Eukalyptus a k čemu se používá**

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahují léčivé látky dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolesti v krku a záněty v ústní dutině.

Strepsils Mentol a Eukalyptus se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Mentol a Eukalyptus používat**

**Nepoužívejte Strepsils Mentol a Eukalyptus:**

- jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- přípravek není určen dětem do 12 let.

**Upozornění a opatření**

Před použitím Strepsils Mentol a Eukalyptus se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- Strepsils Mentol a Eukalyptus je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);
- přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

**Děti:**

Strepsils Mentol a Eukalyptus není určen dětem do 12 let.

### **Další léčivé přípravky a Strepsils Mentol a Eukalyptus:**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

### **Strepsils Mentol a Eukalyptus s jídlem a pitím:**

Nedoporučuje se používat pastilky během jídla.

### **Těhotenství, kojení a plodnost:**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Strepsils Mentol a Eukalyptus nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

### **Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje glukosu a sacharosu.**

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosu a 1,5 g sacharosu v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

## **3. Jak se Strepsils Mentol a Eukalyptus používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Mentol a Eukalyptus jsou určeny dospělým a dospívajícím starším 12 let.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Použití u dospívajících od 12 let: každé 2 – 3 hodiny nechat volně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Používejte maximálně 8 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

### **Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Mentol a Eukalyptus, než jste měl(a):**

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout jsou uvedeny níže dle následujících četností:

### **Není známo (z dostupných údajů nelze určit):**

- hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti porojevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);
- vyrážka;
- bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

#### **Hlášení nežádoucích účinků:**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co Strepsils Mentol a Eukalyptus obsahuje**

Léčivými látkami jsou: alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum.

Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg.

Pomocnými látkami jsou: prostý sirup 67 %, tekutá glukosa, kyselina vinná, blahovičnicková silice, indigokarmín a levomenthol.

### **Jak Strepsils Mentol a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení:**

Modré kulaté pastilky charakteristické chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky, uložené v blistru a krabičce.

Balení obsahuje: 16, 24 a 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

### **Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH

Slough, Velká Británie

### **Výrobce:**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB

Nottingham, Velká Británie

**Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flóra

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel.: +420 227 110 141

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.6.2016.**