

Příbalová informace: informace pro pacienta

Larymed citron 3 mg pastilky benzydamin hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Larymed a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Larymed používat
3. Jak se Larymed používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Larymed uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Larymed a k čemu se používá

Larymed obsahuje léčivou látku benzydamin hydrochlorid.

Larymed se používá k lokální léčbě příznaků akutní bolesti v krku u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Larymed používat

Nepoužívejte tento přípravek:

- jestliže jste alergický(á) na benzydamin hydrochlorid nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Larymed se poradte se svým lékařem nebo lékařem, jestliže:

- trpíte onemocněním známým jako fenylketonurie.
- máte nebo jste někdy měl(a) astma.
- jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. na kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).
- Pokud se bolest v krku po použití pastilky zhorší nebo se do 3 dnů nezlepší, nebo se u Vás objeví horečka nebo silná bolest v krku či jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem.

Děti

Přípravek Larymed nemá být vzhledem k lékové formě podáván dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Larymed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Larymed s jídlem a pitím

Jídlo a nápoje nemají žádný vliv na používání přípravku Larymed.

Těhotenství, kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V průběhu těhotenství a kojení nemá být Larymed používán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Benzydamin-hydrochlorid nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Larymed obsahuje isomalt a aspartam

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,409 mg aspartamu v jedné pastilce.

Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, protože ho tělo nedokáže správně odstranit.

3. Jak se přípravek Larymed používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Pro dospělé, dospívající a děti od 6 let: 1 pastilka 3krát denně k cucání v případě potřeby úlevy od bolesti. Nepoužívejte více než 3 pastilky denně.

Nepoužívejte Larymed déle než 7 dnů.

Pokud příznaky přetrvávají, nebo se po 3 dnech zhorší, nebo se u Vás objeví horečka, silná bolest v krku či jiné příznaky, poraďte se se svým lékařem.

Děti od 6 do 11 let: tento léčivý přípravek má být podáván pod dohledem dospělé osoby.

Orofaryngeální podání:

1 pastilku nechte pomaly rozpustit v ústech.

Pastilku nepolykejte vcelku.

Pastilku nežvýkejte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Larymed, než jste měl(a)

Pokud náhodou použijete nadměrné množství pastilek, kontaktujte svého lékárníka, lékaře nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.

I když velmi zřídka, u dětí byly po použití benzydaminu v dávkách 100násobně vyšších, než jsou dávky obsažené v pastilce, hlášené příznaky předávkování v podobě excitace (nabuzení), křečí, pocení, poruchy hybnosti projevující se špatnou koordinací pohybů, třesu a zvracení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Larymed nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:

- velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
- časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
- méně časté: mohou postihnout až 1 z 100 osob
- vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob
- velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob
- není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

Méně časté

- citlivost kůže na sluneční záření (způsobující vyrážku nebo spálení sluncem).

Vzácné

- pocit pálení v dutině ústní. Pokud se tento příznak u Vás objeví, vyzkoušejte popíjení skleničky vody ke zmírnění účinku.

Velmi vzácné

- příznaky zahrnující potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě (angioedém).
- potíže s dýcháním (zúžení hrtanu nebo průdušek).

Není známo

- alergická reakce (přecitlivělost).
- závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest nebo tíseň na hrudi a / nebo pocit závratí/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici.
- místní ztráta citlivosti sliznice v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Larymed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Larymed po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Larymed obsahuje

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg (ekvivalentní benzydaminum 2,68 mg).

Dalšími složkami jsou isomalt (E 953), monohydrát kyseliny citronové, aspartam (E 951), chinolinová žluť (E 104), citronové aroma, silice máty peprné.

Jak Larymed vypadá a co obsahuje toto balení

Larymed citron 3 mg pastilky jsou kulaté, žluté pastilky s citronovou příchutí a s průměrem 19±1 mm.

Pastilky jsou dostupné v PVC-PVDC/Al blistrech.

Velikost balení: 12, 20, 24 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Výrobce

Lozy's Pharmaceuticals
Campus Empresarial
31795 Lekaroz (Navarra)
Španělsko

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlín
Německo

Infarmade, S.L.
C/ Torre de los Herberos, 35, P.I. Carretera de la Isla
Dos Hermanas,
41703 Sevilla
Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Larymed citron

Rumunsko

Faringo lamaie 3 mg pastile

Španělsko

IosBenc 3mg pastillas para chupar sabor limón

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 4. 2019.