

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!

JODISOL ROZTOK **Povidonum iodinum**

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
SpofaDental a.s., Jičín, Česká republika

Složení ve 100 g:

léčivá látka: Povidonum iodinum 3,85 g
pomocná látka: Ethanol 95 %

Indikační skupina

Dezinfekční a antiseptický přípravek.

Charakteristika

Jodisol roztok je vysoce účinný dezinfekční přípravek. Je to tříprocentní lihový roztok komplexní sloučeniny (jodofor) s možností širokého použití. Má velký rozsah účinku na množící se formy mikroorganismů t.j. bakterie, plísňe i na viry. Jod vázaný v komplexu se uvolňuje v koncentraci, která postačuje k dezinfekci, ale nepoškozuje kůži ani sliznici. Plné působení nastupuje za 1 - 5 minut po použití. Na pokožce a sliznici trvale hubí růst choroboplodných mikroorganismů.

Indikace

Ošetření lékařem u dětí, mladistvých a dospělých:

- 1) povrchová dezinfekce kůže před drobnými výkony (injekce, punkce apod.)
- 2) příprava operačního pole
- 3) ošetření při obtížném prořezávání zubů
- 4) ošetření po odstranění mandlí

Ve stomatologické protetice je vhodné používat Jodisol roztok k dezinfekci otisků, ponořením do zředěného roztoku Jodisolu (1:10).

Použití bez lékařské pomoci u dětí, mladistvých a dospělých:

- 1) dezinfekce rukou
- 2) ošetření drobných poranění kůže (trhlinky)
- 3) ošetření oparů
- 4) ošetření při zánětu ústní sliznice
- 5) ošetření po bodnutí hmyzem

Použití ve vodném roztoku 1 : 20:

- 1) výplachy
- 2) obklady
- 3) kloktání

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na léčivou nebo pomocnou látku. Pouze po poradě s lékařem se přípravek používá u dětí do šesti měsíců, při poruchách činnosti štítné žlázy, poruchách činnosti ledvin, u těhotných žen a kojících matek.

Nežádoucí účinky

Nejsou popsány. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Interakce

Jodisol ztrácí účinnost při styku s mýdlem, alkalickými látkami, mlékem a bílkovinami.

Způsob použití

Nanáší se na postižené místo buď přímo (např. pomocí vatového tamponu) nebo může být použit v roztoku zředěném vodou v poměru až 1:20. Zředěné vodné roztoky jsou vhodné k přípravě obkladů, omývání, výplachům, kloktání atd. obvykle 2x denně, pokud lékař neurčí jinak.

Upozornění

Nedochází-li k prokazatelnému hojení do 3 dnů, poraďte se s lékařem.

Zředěný roztok je zbarven žlutohnědě. Pokud roztok změní barvu (do světlejšího odstínu) např. vystavením přímému světlu, ztrácí svoji účinnost. Nepoužívat vnitřně!

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu světlu.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu.

Balení

3,6 g pero

80 g

760 g

Datum poslední revize:

3.3.2010