



Podpora imunitního systému*

40 let výzkumu inspirovaného mateřským mlékem

GOOD NIGHT

POKRACOVACÍ MLÉČNÁ KOJENCKÁ VÝŽIVA V PRÁŠKU
NAŠLEDNÁ MLÉČNÁ DOJČENSKÁ VÝŽIVA V PRÁŠKU

6 - 12 měsíců/mesiacov

800 g e

*Obsahuje vitamíny A, C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému

Složení/Zloženie:

Složení se vztahuje k súčinnému stavu potravy.

Složenie sa vztahuje k súčinnému stavu potravy.

Důležité upozornění:

- Po výšu kojeneckého a nejvhodnějšího stavu zásobování dítětem je Nutrilon® Good Night.
- Výrobek je určen pro dítě od 6 měsíců.
- Nutrilon® Good Night může být součástí směsi a využíván v rámci stravy dítěte a může se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šest měsíců života.

- Rozhodnutí o začátku podávání příručky, včetně jakékoli výjimky z pravidla věku šesti měsíců by mělo být přimáho založeno na zakladě doporučení Českého svazu jídla a výživy (CzSJV) a Českého lekařského svazu (CLS).
- Před zdroji kojetiny je důležité dosledně dodržovat návody na přípravu i uvedené doporučení.

- Důležité upozornění:
- Po výšu kojetiny je najvhodnější a na vhodnému stavu zásobitím svých živin a ich kvalitu mateřského mléka.

- Nutrilon® Good Night může být sázecou zmíernení a vyvážení stravy dítěta a nemá se používat ako náhrada mateřského mléka počas prvních šest měsíců života.

- Rozhodnutí o začátku podávání příručky, včetně jakékoli výjimky z pravidla šestich měsíců, by mělo být přimáho založeno na zakladě rady nejnovějšího CzSJV a CLS.
- Výrobek je určen pro dítě a může se používat až do výročí dítěte až do 36 měsíců.
- Amfotericin a jiné výrobky, které mají vliv na starostlivost o matku a dítě, a to v závislosti na individuálném rastu a využitých potřebách konkrétněho dítěte.

- Pře držatele dojčete dletoče dosledně dodržovat návody na přípravu i uvedené doporučení.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Nutrilon® 2 Good Night 6 - 12 měsíců/mesiacov

Doporučené množství mléka denně je orientační, řídí se individuální potřebou dítěte a doporučením Vašeho pediatra. Nikdy nepřidávejte do dítěte výžvy více odměr, než je stanovené.

Doporučené množství mléka denně je orientační, řídí se individuální potřebou dítěta a doporučením Vašeho pediatra. Nikdy nepřidávejte do dítěte výžvy více odměr, než je stanovené.

Vík dítěta / Vek dieťa: Min. počet doporučených dávek na den / doporučovaných dávek na den

6-8 měsíců/mesiacov 5x 200 ml/mléka/mlieka

9-12 měsíců/mesiacov 4x 200 ml/mléka/mlieka

11-12 měsíců/mesiacov 2-3x 200 ml/mléka/mlieka

Příprava jedné dávky / Příprava jedné dávky

Voda	Počet zavázaných odměrek / odmieriek	Výdejna dávka mléka / mlieka
90 ml	3	100 ml
180 ml	6	200 ml

100 ml Nutrilon® 2 Good Night + 90 ml plevelené/výpravené vody + 3 zavázané odměrky/odmierky = 295 ml (70 král) 1 zavázaná odměrka / odmierka + 5 J g sůškou prášku. Používajte originální odměrku z výrobku / používajte originálnou odměrku.

Dôležité radu: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte. Nezohrimejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předstí opaření dítěte v důsledku nevonného ohňa. Dohledněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, předešlym před spánkem.

Dôležité radu: Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, následně zlikvidujte. Nezohrimejte stravu v mikrovlnné röre, aby ste předstí opaření dítěta v důsledku nevonného ohňa. Dohledněte na hygienu ústní dutiny v období růstu prvních zoubků, pred spánkem.

Návod na přípravu: / Návod na přípravu:

1 Vysterilujte všechno používané nádoby a převálečte pitnou vodu uzenou po kojení. Nechte ji v konvičce vychladnout až 30 minut na přibližně 40 °C. Odpovídající množství plevelené vody (viz tabulka) vyleje do vysterilované lávě.

Vysterilujte všechno používané nádoby a převálečte pitnou vodu uzenou po kojení. Nechte ji v kanvici vychladnout až 30 minut na přibližně 40 °C. Zlepovadloce množství plevelené vody (viz tabulka) vyleje do vysterilované flásek.

2 Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prásek v ní zavázejte pomocí speciálního plastočeského pásky vrátit obalu.

Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prásek v ní zavázejte pomocí speciálního plastočeského pásky vrátit obalu.

3 Dohleďte s vodou předloží odpovídající množství prášku (viz tabulka). Uzavřete láhev a počkejte až dohlédnete protější v své polohě.

Do flásek s vodou přidaje zlepovadloce množství prášku (viz tabulka). Uzavřete flášku a 10 sekund ji dokleďte protřepáním v závislosti na polohě.

4 Při podávání ověřte teplotu mléčné směsi káprutin na vnější stranu záplasti a ihned podávejte.

Při podávání ověřte teplotu mléčné zmesi káprutin na vnější stranu záplasti a ihned podávejte.

Uchovávání:

Po každom použití obal vždy pečlivě uzavrite a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (max. 25 °C, ne v ledničke).

Uchovávání:

Po každom použití obal vždy starostlivě uzavorte a uchovávejte ho na suchém a chladném místě (max. 25 °C, ne v ledničke). Vlhkú odměrku nevkladajte do obalu. Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.

EXPERT NA VÝŽIVU V RANÉM VĚKU/RANOM VEKU

Jíž více než 40 let se nás tým 400 vědců a odborníků venuje **výzkumu mateřského mléka** a zkoumá, jak podporovat vývoj dítěte a jeho imunitní systém.

Díky našemu výzkumu mateřského mléka přinášíme pokračování mlékа Nutrilon® s Pronutra™, která jsou speciálně využívána pro podporu imunitního systému dítěte*.

40-let-výzkumu

Nutrilon Good Night doporučujeme používat jako poslední dávku výžvy před uložením na spánek. Během dne pak můžete podávat běžnou kojenec-kojeneckou výživu.

inspirovaného mateřským mlékem

Výživové údaje	na 100 ml
Energetická hodnota/Energie	295 kJ 70 kcal
Tuky	2,9 g
z toho nasyté/	1,3 g
nasyté mastné kyseliny	9,2 g
Sacharidy	6,7 g
z toho cukry	0,6 g
Vláknina	0,6 g
Mléčné bílkoviny/	14 g
Mléčné bílkoviny/	0,04 g
Sál/Sol	52 µg-RE
Vitamininy	
A	13 µg
D3	1,4 mg
E	4,8 µg
K1	8,8 mg
Ch	0,06 mg
Thiomin/Thiamin (B1)	0,05 mg
Riboflavin/Riboflavin (B2)	0,05 mg
Miac/Naic (B3)	0,41 mg
kyselina parantiofenová/	0,35 mg
pantoténová/	0,04 mg
B6	0,11 µg
Kyselina listová	0,18 µg
B12	1,4 µg
Biotin/Biotin	1,0 mg
Mineřal/Minerál/látky	
Sodík	17 mg
Draslík	70 mg
Chlorid	45 mg
Vápník/Vápník	67 mg
Fosfor	37 mg
Hojčík/Hořčík	4,5 mg
Železo	1,0 mg
Zinek/Zinok	0,52 mg
Med / Med	0,04 mg
Mangan / Mangan	0,009 mg
Ručenka / Ručenka	≤0,003 mg
Selen / Selen	1,6 µg
Jód	10,6 µg
Ostatní důležité/ostatné důležité látky	
L-karotín/L-karotín	0,77 mg
Taurin/Taurin	5,5 mg
Cholin/Cholin	8,9 mg
Inositol/Inositol	3,6 mg
Nukleotidy	
Cytidyl/Cytidyl 5 - monofosfat	1,1 mg
Uridin/Uridin 5 - monofosfat	0,78 mg
Adenosin 5 - monofosfat	0,68 mg
Guanosin/	
Guanosin 5 - monofosfat	0,25 mg
Inosin/inosin 5 - monofosfat	0,45 mg
Omega 3 mastné kyseliny	
ALA - kyselina alfa	73 mg
linoleová/linoleová	5,6 mg
DHA - kyselina dokosahexaenoová/	5,6 mg
dokosahexaenoová	
EPA - kyselina eicosapentaenoová/	1,2 mg
eicosapentaenoová	
Omega 6 mastné kyseliny	
LA - kyselina linoleová	394 mg
AA - kyselina arachidonová/	
arachidonová	5,6 mg

Potřebujete paradi? Nutrikub vám jako jediný nabízí kompletní poradenství přizpůsobené vašim potřebám. Naše dětské sestry, nutriční terapeutky a porodní asistentky s dlouhodobou praxí můžete kontaktovat rámcem 5 dní v týdnu.



info@nutrikub.cz
info@nutrikub.sk



Nutrilon Česká republika
Nutrilon Slovenská republika



800-110-000
0800-601-600



www.nutrikub.cz
www.nutrikub.sk



803816485 / 10337888

03816485 / 10337888
8 590340 145346
0127901-01-0005

Barcode
Minimální trvanlivost do: viz výše
Minimálná trvanlivost do: vid výše

DANONE
DANONE

* z toho laktóza = 6,4 g / 100 ml kojeneckojeneckého mléka
scGOS/lcFO - 0,8 g / 100 ml kojeneckojeneckého mléka /
doporučené množství GOS/FOS - galaktosugosacharidy/
fruktosugosacharidy