

Návod k použití/rozsah povoleného použití SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům!

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pokojevé rostliny, okrasné rostliny	v mšice, molice, svilušky, puklice, červci, cikády, třásněnky, housenky, minující škůdci, pilatky, brouci	- podle návodu	AT	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) skleníky
pokojevé rostliny, okrasné rostliny	mšice, molice, svilušky, puklice, červci, cikády, třásněnky, housenky, minující škůdci, pilatky, brouci	- podle návodu	AT	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) venkovní prostory
brambor	mšice	- podle návodu	14	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	aplikace bez ředění	2x	21 dnů
okrasné rostliny, pokojevé rostliny	aplikace bez ředění	4x /rok (skleníky), 2x /rok (venkovní prostory)	10-14 dnů (skleníky), 21 dnů (venkovní prostory)

Upřesnění použití

Skleník je definován Nařízením (ES) č. 1107/2009. Přípravek se nedoporučuje aplikovat při teplotách nad 25 °C.

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Další omezení

Maximální doba aplikace při použití zádového postřikovače je 30 minut. Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy. Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty. Zabraňte vstupu domácích a hospodářských zvířat na ošetřená místa. Zvláště nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana. Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované plochy. Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory! Je-li aplikace prováděna v bytě na pokojevé nebo okrasné rostliny, po aplikaci místnost vyvětrejte. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných prostředků.

Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných prostředků (OOP) se důkladně umyjte. Po skončení práce pracovní oděv a další OOP vyperte / očistěte. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Vstup do ošetřeného skleníku/ fóliovníku za účelem kontroly postřiku je možný až po zaschnutí postřiku a po důkladném vyvětrání skleníku. Vstup do ošetřeného skleníku/fóliovníku za účelem provádění zelených prací s ošetřenými rostlinami je možný až druhý den po aplikaci. Při ošetřování okrasných rostlin v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření: - přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše
- doporučujeme po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezit (popř. omezit) vstupu osob na ošetřené ploše
- opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a případně krmiv.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje není nutná. Ochrana těla ochranný/pracovní oděv (oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice, především při aplikaci ve skleníku/fóliovníku). Dodatečná ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou uzavřená obuv (s ohledem na vykonávanou práci). Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. proražené rukavice) je třeba vyměnit.

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí; nebo při podezření na a lergickou kožní reakci – vyrážka, zarudnutí či pálení kůže apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování Přípravek skladujte při teplotě 0 °C až +40 °C v originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků Prázdné obaly od přípravku se předají do děleného sběru nebo se likvidují jako komunální odpad. Přípravek ani vyprázdněné obaly nesmějí přijít do vodotečí nebo kanalizace. Zbytky přípravku v původním obalu se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Další údaje a upřesnění Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Upřesnění použití Před použitím přípravku důkladně protřepejte. Přípravek se aplikuje ručně postřikem pomocí postřikovací trysky do počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Termín aplikace: od začátku výskytu škodlivého organismu.