

Pouze pro on-line



OD UKONČENÉHO
6. MĚSÍCE/MESIACA

2 BIO Combiotik

Pokračovací mléčná kojenecká/Následná mliečna dojčenská výživa Výška plnení je technicky podmínená/výška plnenia je technicky podmienená. Skladujte v suchu/pri max 25 °C. Minimálna trvanlivosť/Minimální trvanlivosť do: viz zadní/zadná strana výrobku.

Výživové údaje/100 ml: Energetická hodnota/Energie 285/68 kJ / kcal, Tuky 3,7 g, z toho = nasycené/nasycené MK 1,4 g = mono-nenasycené/nenasycené MK 1,8 g = poly-nenasycené/nenasycené MK 0,5 g, z toho kyselina linolová (omega 6 MK) = 0,42 g, kyselina linolénová/linolénová (omega 3 MK) = 0,06 g = DHA kyselina dokozahexaenová/dokosahexaenová 13,6 mg, Sacharidy 7,2 g, z toho = cukry 7,2 g = laktóza 7,0 g, Vláknina 0,5 g, Bielkoviny/Bielkoviny 1,3 g, sodík 20 mg, draslík 84 mg, chlorid 52 mg, vápník/vápnik 70 mg, fosfor 40 mg, horčík/horčík 6,3 mg, železo 1,0 mg (13 %), zinek/zinok 0,50 mg, měď/med 0,054 mg, mangán/mangán 0,0070 mg, fluoridy <0,0050 mg, selen/selén 3,9 µg, jód 15 µg, Vitamin A 56 µg (14 %), Vitamin D 1,6 µg (23 %), Vitamin E 0,80 mg, Vitamin K 3,1 µg, Vitamin C 10,0 mg (27 %), Vitamin B1 0,040 mg, Vitamin B2 0,14 mg, niacin/niacín 0,53 mg, Vitamin B6 0,040 mg, kyselina listová 10 µg, Vitamin B12 0,10 µg, Biotin/Biotín 1,6 µg, kyselina pantoténová/pantoténová 0,35 mg. Hodnoty podľahajú výkyvom typické pre prírodné suroviny/podliehajú výkyvom bežných pre prírodné suroviny. Balené v ochranné atmosfére/ochrannej atmosfere. MK = mastné kyseliny, 'referenčného príjmu/referenčného príjmu'

Dôležité upozornení • Dôležité upozornenia: Výlučné kojení je v prvňích měsících nejlepší. Nevhodné jako náhrada materského mléka během prvních šesti měsíců. Určeno pro výžvu od ukončeného 6. měsíce, má být součástí smíšené stravy. Nevhodné jako jediný zdroj výžvy. Rozhodnutí o příkrmování, a jakékoli výjimky by mělo být přijímáno jen na doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výžvy, farmacie nebo péče o matku a dítě, a na individuálních potřebách. Jako materské mléko obsahují kojenecké výžvy sacharidy, které mohou způsobit zubní kaz. Nenechávejte dítě pit z lávky po dlouhou dobu, naučte ho co nejdříve pit z hrnečku. Venujte pozornost vyážené stravě a zdravému životnímu stylu. / Vylučné dojenie je v prvých mesiacoch najlepšie. Nemá sa používať ako náhrada materského mlieka behom prvých šiestich mesiacov. Určeno pre výžvu od ukončeného 6. mesiaca a má byt současťou zmesanej stravy. Nie je vhodný ako jediný zdroj výžvy. Rozhodnutie začať podávať príkramy, a akékoľvek výnimky, by malo byt prijímané len na odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výžvy, farmácie alebo starostlivosť o matku a dieťa, v závislosti na individuálnych potrebach. Ako materské mlieko obsahujú dojčenské výžvy sacharidy, ktoré môžu spôsobiť zubný kaz. Nenechávajte dieťa dlho piť z fláše a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyáženéj strave a zdravému spôsobu života.

HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, hipp.cz, hipp.sk

Balené: Německo/Nemecko.



e 200 ml

DE-ÖKO-001

Zemědělská produkce/ Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EU

2225

NOVINKA

Pouze pro online

Složení/Zloženie: MLÉČNÁ SYROVÁTKA*/MLIEČNÁ SRVÁTKA*, voda, odtučněné MLÉKO*/odtučnené MLIEKO*, SMETANA*/SMOTANA*, LAKTOZA* (z MLÉKA*/MLIEKA*) rostlinné/rastlinné oleje* (slunečnicový/slnečnicový*, řepkový/repkový*) galaktooligosacharydy* z LAKTOZY (z MLÉKA*/MLIEKA*), emulgátor lecitin*/lecitin*, citronan vápenatý, RYBÍ olej*, chlorid draselný, vápenaté soli kyseliny ortofosforečné/ ortofosforečnej, draselné soli kyseliny citrónové/citrónovej, L-askorbát sodný + askorbyl-L-palmitan (vitamin C), L-fenylalanin/fenylalanín, chlorid sodný, hydroxid horečnatý/horečnatý, L-tryptofán/tryptofán, síran železnatý, síran zinečnatý/zinočnatý, citronan sodný, nikotinamid/nikotinamid, DL-alfa-tokoferol acetát (vitamin E), síran-mědnatý/mednatý, D-pantothénát vápenatý, retinyl acetát (vitamin A), hydroxid draselný, thiamin/tiamín hydrochlorid (vitamin B1), hydrochlorid pyridoxinu/pyridoxinu (vitamin B6), jodičnan draselný, kyselina listová, seleničitan sodný, síran manganační, fytomenadión (vitamin K), cholekalciferol (vitamin D), D-biotin/biotin, kyanokobalamín/kyanokobalamín (vitamin B12). 1LCP (omega 3 MK) = nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem/nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem *z ekologického zemědělství/pořízeného zemědělství/pořízeného poľnohospodárstva (DE-OKO-001)

Návod k přípravě: Studené nebo teplé, k přímé spotřebě. Víčko musí být před prvním použitím nepoškozené, jinak nepoužívejte. Během skladování může dojít k mírnému oddělení složek, lahvičku protřepejte. Neohřívejte v mikrovlnce. Neohřáté mléko uchovávejte v uzavřené láhvi v ledničce a spotřebujte do 24 hodin po otevření. Požadované množství v případě potřeby ohřejte ve vhodné nádobě na teplotu k pití (37°C). Ověřte vyhovující teplotu mléka. Ihned krmte. Zbytky ohřátého mléka již znova nepodávajte! Nesprávná příprava a uchovávání ohřátého mléka dlouhou dobu může ohrozit dítě, např. růstem bakterií. Láhev a její součásti vymýte./**Návod na přípravu:** Studené alebo teplé, k přímé spotřebě. Víčko musí být pred prým použitím nepoškodené, inak nepoužívejte. Počas skladovania musá dojsť k miernemu oddeleniu zložiek, flášičku pretrepte. Neohrievajte v mikrovlnke. Neohriate mlieko uchovajte v uzavretej fláši v chladničke a spotrebujte do 24 hodin po otvorení. Požadované množstvo v prípade potreby ohriйте vo vhodnej nádobe na teplotu na pitie (37 °C). Overte vyhovujúce teplotu mlieka. Ihneď krmte. Zvyšky ohriatého mlieka už znova nepodávajte! Nesprávna priprava a uchovávanie ohriatého mlieka dlhú dobu môže ohrozit dieťa, napr. rastom baktérií. Flášu a jej súčasti vymyte.

Použití/Použitie: v období příkrmování – v návaznosti na kojení nebo na jakoukoliv mléčnou výživu, pokud je Vaše dítě již příkrmováno.

v období prikrmovania – v nadväznosti na dojčenie alebo na akúkolvek dojčenskú výživu, pokiaľ je už Vaše dieťa prikrmované.

Věk/Vek od ukončeného 6.měsíce/mesiaca	Množství mléka/Množstvo mlieka ml 170-200
---	--

Kojenci potřebují cca 5 jídel/den. 1 nově přidaný nemléčný příkrm nahrazuje 1 mléčnou porci. / Dojčatá potřebují cca 5 jedál/ deň. 1 novo přidaný nemléčný příkrm nahraďuje 1 mléčnu porciu.