

**Písomná informácia pre používateľa**  
**SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA**  
čapíky  
glycerol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

## **1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa**

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Glycerín (glycerol), ktorý je súčasťou čapíka, na seba viaže vodu, zmäkčuje stolicu, zväčšuje jej objem v dolnej časti hrubého čreva a uľahčuje tak jej odchod pri zápche. Účinok sa dostaví po 10 - 20 minútach po použití.

Čapíky SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA používajú dospelí, dospelievajúci a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, v šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

## **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA**

**Nepoužívajte SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA**

- ak ste alergický na glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- pri bolestivých trhlinkách v oblasti konečníka,
- pri krvácajúcich hemoroidoch.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho nepretržité denné používanie po dobu dlhšiu ako 1 týždeň. Pri zápche dodržiavajte vhodnú životosprávu (dostatok pohybu, strava bohatá na vlákninu, t.j. ovocie, zelenina, celozrnné pečivo, dostatočné množstvo tekutín a pod.). Pri krvácaní z konečníka alebo nemožnosti sa vyprázdniť po použití týchto čapíkov vyhľadajte lekára, môže ísť o závažné ochorenie. Pri dlhodobej zápche vyhľadajte lekára. Nepoužívajte liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA dlhšie ako 1 týždeň bez poradenia sa s lekárom.

### **Deti a dospievajúci**

Liek nie je určený deťom mladším ako 10 rokov.

### **Iné lieky a SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA**

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že používate liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA.

Liek sa prakticky nevstrebáva, preto používanie týchto čapíkov neovplyvňuje účinky iných súčasne užívaných liekov. Bez súhlasu lekára však nepoužívajte súčasne s týmto liekom iné lieky vo forme čapíkov.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Liek sa môže používať v tehotenstve a pri dojčení.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

## **3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA**

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

### Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov si podľa potreby zavádzajú 1 čapík do konečníka. Liek vyvolá vyprázdenie stolice po 10 - 20 minútach po zavedení čapíka.

### Nácvik vyprázdenia stolice pri návykovej zápche

Ráno po zobudení vypite pohár vody alebo čaju, po pol hodine sa naraňajkujte a po raňajkách zaveďte do konečníka 1 čapík SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA. Hneď ako sa dostaví nútenie na stolicu, najdlhšie však do pol hodiny, pokúste sa o vyprázdenie. Po niekoľkých dňoch vynechávajte čapíky a pokúšajte sa o vyprázdenie stolice v rovnakom čase bez čapíkov.

Pred použitím uvoľnite čapík roztrhnutím nastrihutej fólie nad špičkou čapíka.

### **Ak použijete viac SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, ako máte**

Pri náhodnom požití väčšieho množstva čapíkov, najmä deťmi, môže dôjsť k žalúdočnej nevoľnosti, prípadne k vracaniu. Je vhodné vypíť väčšie množstvo studenej vody a vyhľadať lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

#### 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Neznáme vedľajšie účinky** (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Môže dôjsť k dráždeniu konečníka so svrbením a pálením. V tomto prípade alebo ak sa vyskytnú iné nezvyčajné reakcie, prestaňte čapíky používať a poraďte sa s lekárom.

#### Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom **národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

#### 5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Tento liek uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajúte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

#### 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

##### Čo SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA obsahuje

- Liečivo je glycerol 85 % 2,06 g v každom čapíku.
- Pomocné látky sú dekahydrát uhličitanu sodného, kyselina steárová.

##### Ako vyzerá SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a obsah balenia

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA sú priehľadné, slabo opaleskujúce, bezfarebné až nažltkasté čapíky, torpédovitého tvaru.

Veľkosť balenia: 10 čapíkov.

##### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.**