

## Písomná informácia pre používateľa

### PARALEN 125 125 mg tablety

paracetamol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa príznaky ochorenia vášho dieťaťa nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je PARALEN 125 a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN 125
3. Ako užívať PARALEN 125
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať PARALEN 125
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je PARALEN 125 a na čo sa používa**

Paracetamol, liečivo lieku PARALEN 125, pôsobí proti bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Tablety PARALEN 125 sa podávajú det'om na zníženie horúčky a bolesti pri chrípke, nachladnutí a infekčných ochoreniach detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovaní.

Tablety PARALEN 125 sú tiež vhodné pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. pri bolestiach hlavy, zubov, bolesti sprevádzajúce prerezávanie zúbkov, bolesti hrdla a bolesti pohybového ústrojenstva nezápalového pôvodu.

Ak sa do 3 dní nebude vaše dieťa cítiť lepšie alebo ak sa príznaky jeho ochorenia zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Vzhľadom na liekovú formu je liek vhodný pre deti od 3 rokov.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN 125**

##### **Nepodávejte PARALEN 125 dieťaťu**

- ak je alergické na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- pri závažnom ochorení pečene alebo pri akútnej zápalnej pečene,

- ak má závažnú formu určitého typu málokrvnosti nazývanú hemolytická anémia.

### **Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete podávať PARALEN 125 diet'a/u, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

- má ochorenie obličiek alebo pečene,
- má nedostatok enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (diedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),
- súbežne užíva lieky ovplyvňujúce funkciu pečene,
- má precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Užívanie vyšších ako odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Vplyv paracetamolu (liečiva PARALENU 125) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.

Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. postupujúca kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými lezámi), prestaňte liek diet'a/u podávať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak si nie ste istý, či sa uvedené týka vášho diet'a/a, porad'te sa so svojím lekárom.

O vhodnosti súbežného podávania tablet PARALEN 125 deťom s inými liekmi proti bolesti a prechladnutiu sa porad'te s lekárom.

Nepodávajte tento liek deťom bez odporúčania lekára, ak trpia ochorením pečene.

Nepodávajte súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.

Pri ochorení obličiek je možné užívať PARALEN 125 tablety len po porade s lekárom.

### **Iné lieky a PARALEN 125**

Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepodávajte tento liek deťom, ak užívajú akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.

O užívaní PARALENU 125 sa porad'te so svojím lekárom, ak vaše dieťa užíva:

- lieky na liečbu nevoľnosti, vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín),
- kolestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),
- niektoré lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné lieky znižujúce zrážanlivosť krvi),
- lieky na liečbu epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín, topiramát),
- lieky na liečbu depresie (inhibítory monoaminoxidázy, tricyklické antidepresíva),
- lieky na spanie, upokojenie a iné lieky tlmiace centrálny nervový systém (barbituráty),
- probenecid (liek na liečbu dny),
- kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,
- zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),
- rifampicín alebo izoniazid (lieky na liečbu tuberkulózy),
- antibiotiká (flukloxacilín, chloramfenikol),
- lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že dieťa užíva tablety PARALEN 125.

Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospievajúcim alebo dospelým, je potrebné upozorniť lekára na užívanie ústami podanej antikoncepcie.

#### **PARALEN 125 a jedlo, nápoje a alkohol**

Ak sa počas liečby objavia zažívacie tŕžkosti, podávajte liek počas jedla. Liek je určený deťom, ak by však mal byť podaný dospelým, nesmú ho užívať osoby, ktoré majú problém s požívaním alkoholu.

Počas liečby je zakázané požívanie alkoholických nápojov.

#### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek je určený na podanie deťom, ak by však vo výnimočných prípadoch mal byť podaný tehotnej alebo dojčiacej žene, je potrebné dodržať nasledujúce odporúčanie: Ak je to nevyhnutné, PARALEN 125 je možné užiť počas tehotenstva. Užívajte najnižšiu možnú dávkhu, ktorá zmierni vašu bolest a/alebo horúčku, a užívajte ju počas najkratšej možnej doby. Ak sa bolest a/alebo horúčka nezmierni, alebo ak potrebujete liek užívať častejšie, obráťte sa na svojho lekára.

Dojčiace ženy môžu liek užívať 1 deň, dlhšie ako 1 deň môžu liek užívať len so súhlasom lekára. Dojčenie nie je potrebné prerušíť počas krátkodobej liečby za predpokladu, že diet'a bude starostlivo sledované.

#### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Liek neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach).

#### **PARALEN 125 obsahuje sodík**

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

### **3. Ako užívať PARALEN 125**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety PARALEN 125 sa podávajú podľa potreby 3–4 krát denne v časových odstupoch 6 hodín v dávkach uvedených v tabuľke. Interval možno skratiť v prípade potreby na 4 hodiny, pričom nesmie byť prekročená celková denná dávka.

<b>Vek</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Jednotlivá dávka</b>	<b>Max. denná dávka</b>
<b>3–6 rokov</b>	9–12 kg	<b>1 tabletu PARALENU 125</b> (125 mg paracetamolu)	600 mg paracetamolu
	13–16 kg	<b>1 a 1/2 tablety PARALENU 125</b> (187,5 mg paracetamolu)	750 mg paracetamolu
	17–20 kg	<b>2 tablety PARALENU 125</b> (250 mg paracetamolu)	1 g paracetamolu
<b>6–12 rokov</b>	21–25 kg	<b>2 – 4 tablety PARALENU 125</b>	1,5 g paracetamolu
	26–40 kg	(250–500 mg paracetamolu)	2 g paracetamolu

Liek je určený pre deti, ak by však vo výnimočnom prípade mal byť podaný mladistvým alebo dospelým pacientom, dávky sú nasledujúce:

Vek	Hmotnosť	Jednotlivá dávka	Max. denná dávka
12–15 rokov	40–50 kg	500 mg paracetamolu	3 g paracetamolu
nad 15 rokov	≤ 50 kg	500 mg paracetamolu	4 g paracetamolu
	> 50 kg	500–1000 mg paracetamolu	

### Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek

Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poradťte s lekárom. Po posúdení zdravotného stavu dieťaťa môže lekár odporučiť zníženie dávok alebo predĺženie dávkovacieho intervalu.

Liečbu môžete ukončiť hned, ako ustúpi horúčka alebo bolest.

Tablety PARALEN 125 sa užívajú pri jedle, užtie pred jedlom zvýši rýchlosť nástupu účinku. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky, zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

Ak do 3 dní tăžkosti (horúčka, bolest) neustúpia alebo naopak sa zhoršia, prípadne sa vyskytnú nezvyčajné reakcie, poradťte sa o ďalšom podávaní lieku dieťaťu s lekárom. Liečba tabletami PARALEN 125 nemá bez súhlasu lekára trvať dlhšie ako 3 dni.

### Ak diet'a podáte viac PARALENU 125, ako máte

**Pri predávkovaní alebo ak diet'a náhodne požije viac tablet, ihned vyhľadajte lekára, aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania,** vzhľadom na riziko tăžkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe!

### Ak zabudnete dieťaťu podať PARALEN 125

Ak zabudnete podať dávku, podajte nasledujúcu dávku lieku akonáhle si spomeniete, dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín a nepodávajte viac ako maximálnu dennú dávku. Nepodávajte dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vyniechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## 4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

**Prestaňte liek dieťaťu podávať a ihned vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u neho objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:**

### Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela najčastejšie tváre (ocí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče),
- závažná alergická reakcia spôsobujúca tăžkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viest' až k šokovému stavu (anafylaktický šok),
- bolest hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka,
- závažné kožné reakcie – závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliah a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pluzzgierov a odlupovania kože.

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

**Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):**

- kožné alergické reakcie, vyrážka.

**Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):**

- poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek, alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejavíť ako krvácanie z d'asien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),
- zúženie priedušiek (môže sa prejavíť dýchavičnosťou),
- žltačka (zožltnutie kože a očí).

**Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):**

- poškodenie pečene, ktoré môže viest' k akútному zlyhaniu pečene.

**Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať PARALEN 125

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

**Čo PARALEN 125 obsahuje**

- Liečivo je paracetamol (paracetamolum) 125 mg v 1 tablete.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob predželatinovaný, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová.

**Ako vyzerá PARALEN 125 a obsah balenia**

PARALEN 125 sú biele až takmer biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a z jednej strany s deliacou ryhou s priemerom 7 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 20 tablet

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

**Výrobcu**

Zentiva k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha - Dolní Měcholupy, Česká republika

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2019.**