VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

	na 100 ml mléka/mleka
Energetická hodnota/Energia	**295 kJ/70 kcal**
Tuky	**3,3 g**
z toho:	
nasycené/nasýtené mastné kyseliny	1,1 g
polynenasycené/polynenasýtené mastné kyseliny	0,6 g
- kyselina arachidonová/arachidónová (ARA)	9,1 mg
- kyselina dokosahexaenová/dokozahexaénová (DHA)	17,5 mg
- kyselina linolová (LA)	448 mg
- kyselina α-linolenová/α-linolénová (ALA)	53,8 mg
Sacharidy	**8,4 g**
z toho:	
cukry	8,3 g
- laktóza	8 g
polyalkoholy/polyoly	
- inositol/inozitol	6,8 mg
Vitamíny	**0,6 g**
z toho:	
galaktooligosacharidy (GOS)	0,5 g
fruktooligosacharidy (FOS)	0,08 g
3'galaktosyllaktóza/ 3'galaktozyllaktóza (3'GL)	0,015 g
Bílkoviny/Bielkoviny	**1,4 g**
Vitamíny	
A	61 µg
D_3	1,75 µg (35 %*)
E	1,5 mg TE
K	5,9 µg
C	9,5 mg (21 %*)
Thiamin/Tiamín (B_1)	0,11 mg
Riboflavin/Riboflavín (B_2)	0,15 mg
Niacin/Niacín (B_3)	0,48 mg
B_6	0,059 mg
Fólát	14 µg
Kyselina listová	8,4 µg
B_{12}	0,19 µg
Biotin/Biotín	1,8 µg
Kyselina pantothenová/pantoténová	0,51 mg
Minerální/Minerálne látky	
Sodík	24,3 mg
Draslík	86 mg
Chloridy	55 mg
Vápník/Vápnik	75 mg
Fosfor	51 mg
Hořčík/Horčík	7 mg
Železo	1,10 mg
Zinek/Zinok	0,52 mg
Měď/Meď	0,055 mg
Mangan/Mangán	0,005 mg
Fluoridy	≤0,006 mg
Selen/Selén	3,2 µg
Jód	14 µg
Ostatní důležité / Ostatné dôležité látky	
L-karnitin/L-karnitín	2 mg
Cholin/Cholín	17 mg
Taurin/Taurín	0,35 mg
Ostatní / ostatné oligosacharidy GOS	0,2 g

*% referenční hodnoty příjmu / referenčného príjmu

Kontakt: NUTRICIA A.S., V PARKU 2294/2, 148 00 PRAHA 4 - CHODOV, CR

NUTRICIA

Nutrilon®

ADVANCED

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ INOVACE
NAŠA NAJNOVŠIA INOVÁCIA

40 let
VÝZKUMU MATEŘSKÉHO MLÉKA

PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU*

HMO a prebiotika GOS/FOS

Živiny na podporu imunitního systému (Vitamíny C a D)*
Omega-3 a 6

2

BEZ PALMOVÉHO OLEJE

KOJENECKÉ MLÉKO
6 – 12 MĚSÍCŮ

800 g e

Pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku. / Následná dojčenská mliečna výživa v prášku.
*Vitamíny C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.

PRAKTICKÉ BALENÍ PRO VÁS / PRAKTICKÉ BALENIE PRE VÁS

Dvojitý bezpečnostní pásek pro dokonalé uzavření a zachování čerstvosti před prvním použitím. / Dvojitý bezpečnostný pás pre dokonalé uzavretie a zachovanie čerstvosti pred prvým použitím.

Zacvaknutí při uzavírání chrání výživu před kontaminací a vysypáním. / Zacvaknutie pri uzatváraní chráni výživu pred kontamináciou a vysypaním.

Navrženo tak, abyste mohli ovládat jednou rukou, když držíte miminko v druhé. / Navrhnuté tak, aby ste ho mohli ovládať jednou rukou, keď držíte bábätko v druhej.

Odměrka pro správné dávkování. / Odmerka na správne dávkovanie.

Místo pro odměrku, aby odměrka ani vaše ruce nebyly v kontaktu s mléčným práškem. / Miesto na odmerku, aby odmerka ani vaše ruky neboli v kontakte s mliečnym práškom.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ / ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Doporučené množství mléka denně je orientační, řiďte se individuální potřebou dítěte a doporučením vašeho pediatra. Nikdy nepřidávejte do dětské výživy více odměrek, než je stanoveno.

Odporúčané množstvo mlieka denne je orientačné, riaďte sa individuálnou potrebou dieťaťa a odporúčaním vášho pediatra. Nikdy nepridávajte do detskej výživy viac odmeriek, ako je ustanovené.

Věk dítěte/ Vek dieťaťa	Min. počet dávek/ dávok za 24 h.	Příprava/ Príprava	Voda	Počet odměrek/ odmeriek prášku
6 – 8 měsíců/mesiacov	5 x 200 ml nebo/alebo 4 x 266 ml mléka/mlieka	200 ml	100 ml	6
9 – 10 měsíců/mesiacov	4 x 200 ml nebo/alebo 3 x 266 ml mléka/mlieka	266 ml	240 ml	8
11 – 12 měsíců/mesiacov	3 x 200 ml nebo/alebo 2 x 266 ml mléka/mlieka	-	-	-

100 ml Nutrilon 2 = 90 ml připravené/prevarenej vody + 3 zarovnané odměrky/odmerky = 293 kJ (70 kcal).
1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,5 g sušeného prášku. Používejte originální odměrku z výrobku / používajte originálnu odmerku.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU / NÁVOD NA PRÍPRAVU

1. Vysterilizujte všechno používané nádobí a převařte pitnou vodu určenou pro kojence. Nechte ji v konvici vychladnout asi 30 minut na přibližně 40 °C. Odpovídající množství převařené vody (viz tabulka) vlijte do vysterilizované láhve. / Vysterilizujte všetko používané náčinie a prevarte pitnú vodu určenú pre dojčatá. Nechajte ju v kanvici vychladnúť asi 30 minút na približne 40 °C. Zodpovedajúce množstvo prevarenej vody (pozrite tabuľku) vlejte do vysterilizovanej fľaše.
2. Na dávkování vždy používejte přiloženou odměrku. Prášek v ní zarovnejte pomocí speciálního plastového pásku uvnitř obalu. / Na dávkovanie vždy používajte priloženú odmerku. Prášok v nej zarovnajte pomocou špeciálnej plastovej pásky vo vnútri obalu.
3. Do láhve s vodou přidejte odpovídající množství prášku (viz tabulka). Ihned po uzavření láhve ji důkladně protřepejte 10 sekund ve svislé poloze. / Do fľaše s vodou pridajte zodpovedajúce množstvo prášku (pozrite tabuľku). Ihneď po uzatvorení fľaše ju dôkladne pretrepte 10 sekúnd vo zvislej polohe.
4. Před podáváním ověřte teplotu mléka kápnutím na vnitřní stranu zápěstí a ihned podávejte. / Pred podávaním overte teplotu mlieka kvapnutím na vnútornú stranu zápästia a ihneď podávajte.

DŮLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVÁNÍ / DÔLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVANIE

- Připravenou stravu spotřebujte do dvou hodin, poté zlikvidujte. / Pripravenú stravu spotrebujte do dvoch hodín, následne zlikvidujte.
- Neohřívejte stravu v mikrovlnné troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí. / Nezohrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli opareniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia.
- Krmíte-li z lahvičky, vyvarujte se dlouhému kontaktu mléčné výživy se zoubky – zvyšuje riziko výskytu zubního kazu. Pečujte pravidelně o zoubky dítěte, zejména před spaním. Požádejte o radu zubního lékaře. / Ak kŕmite z fľaštičky, vyvarujte sa dlhému kontaktu mliečnej výživy so zúbkami - zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. Starajte sa pravidelne o zúbky dieťaťa, najmä pred spaním. Požiadajte o radu zubného lekára.
- Po každém použití obal vždy pečlivě uzavřete a uchovávejte jej na suchém a chladném místě (ne v ledničce). / Po každom použití obal vždy starostlivo uzatvorte a uchovávajte ho na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke).
- Nevkládejte dovnitř víčkou odměrku. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. / Vnútri odmerku nevkladajte do obalu. Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.

800 g e

Początek życia waszego dziecka jest wyjątkowym okresem.

Jest pełen radości, ale też pełen wyzwań, dlatego ważne jest, aby dziecko otrzymywało najlepsze pożywienie. Dlatego właśnie mleko matki jest najlepsze. Jeśli jednak nie jest ono dostępne, mleko modyfikowane Nutrilon jest najlepszą alternatywą.

Začiatok života vášho bábätka je výnimočné obdobie.

Je krásne, občas nevyspytateľné, ale hlavne hektické. Musíte sa starať o veľa vecí, a preto je dôležité mať sa na koho obrátiť. Sme tu pre vás.

Venujeme sa odkrývaniu tajomstva materského mlieka, najlepšej výživy pre imunitu bábätiek. Všetky naše znalosti vkladáme do receptúr podporujúcich imunitný systém* a vývoj** vášho bábätka.

40 let výzkumu mateřského mléka
rokov výskumu materského mlieka

Nutrilon ADVANCED 2

PODPORA IMUNITNÉHO SYSTÉMU*

DOJČENSKÉ MLIEKO
6 – 12 MESIACOV

NAŠE VÝŽIVOVÉ KOMPLETNÍ RECEPTURA* Tým našich vědců, včetně odborníků na imunitu, vyvinul naši recepturu s esenciálními živinami včetně vitamínů přirozeně se vyskytujících v mateřském mléce a dalšími objevy našeho vědeckého výzkumu.

NAŠA VÝŽIVOVO KOMPLETNÁ RECEPTÚRA* Tím našich vedcov, vrátane odborníkov na imunitu, vyvinul našu recepturu s esenciálnymi živinami vrátane vitamínov prirodzene sa vyskytujúcich v materskom mlieku a ďalšími objavmi nášho vedeckého výskumu.

BEZ PALMOVÉHO OLEJA

HMO a GOS/FOS
Oligosacharid mateřského mléka (HMO) 3'GL¹ / materského mlieka (HMO) 3'GL¹

Prebiotika GOS/FOS napodobující funkci oligosacharidů v mateřském mléce / Oligosacharidy GOS/FOS napodobňujúce funkciu oligosacharidov v materskom mlieku

Živiny na podporu imunitního/imunitného systému
Vitamíny C a D* přispívají k normální funkci imunitního systému / Vitamíny C a D* prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému

Omega-3 (ALA** a DHA)*
ALA přispívá k normálnímu vývoji mozku a nervové soustavy / ALA prispieva k normálnemu vývoju mozgu a nervovej sústavy

Omega-6 (ARA)

*Podle požadavků legislativy pro všechna pokračovací kojenecká mléka. ¹3'GL pochází z našeho unikátního procesu
*Podľa požiadaviek legislatívy pre všetku následnú dojčenskú výživu. ¹3'GL pochádza z nášho unikátneho procesu

ROSTEME S VAŠÍM DĚTÁTKEM
Od ukončeného 12. měsíce doporučujeme pokračovat s Nutrilon® 3

RASTIEME S VAŠÍM DIEŤATKOM
Od ukončeného 12. mesiaca odporúčame pokračovať s Nutrilon® 3

POTŘEBUJETE PORADIT V OTÁZKÁCH VÝŽIVY A RODIČOVSTVÍ? NAŠI ODBORNÍCI JSOU TU PRO VÁS.
POTREBUJETE PORADIŤ V OTÁZKACH VÝŽIVY A RODIČOVSTVA? NAŠI ODBORNÍCI SÚ TU PRE VÁS.

Nutriklub

Nutrilon Česká republika
ČR 800 110 000
www.nutriklub.cz
info@nutriklub.cz

Nutrilon Slovenská republika
SR 0800 601 600
www.nutriklub.sk
info@nutriklub.sk

8 590340 104077
10433814
IE 1704 EC
0135642-03-0001
61570
CPAP

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte na suchém a chladném místě (max. do 25 °C, ne v ledničce).
Balené v ochrannej atmosfére. Skladujte na suchom a chladnom mieste (max. do 25 °C, nie v chladničke.)

Minimální trvanlivost do: viz výše
Minimálna trvanlivosť do: pozrite vyššie

DANONE

SLOŽENÍ/ZLOŽENIE

Laktóza (z **mléka**/z **mlieka**), rostlinné/rastlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové / slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej, kokosový, řepkový/repkový, slunečnicový/slnečnicový), sušené odtučněné **mléko** / odtučnené **mlieko**, demineralizovaná syrovátka /syrovátka (z **mléka**/**mlieka**), galaktooligosacharidy (z **mléka**/**mlieka**) 8,6 %, koncentrát syrovátkové bílkoviny/ srvátkovej bielkoviny (z **mléka**/**mlieka**), fruktooligosacharidy 0,6 %, fosforečnan vápenatý, **rybí** olej, **mléčné** bílkoviny/**mliečne** bielkoviny, chlorid draselný, citronan/citran draselný, hydrogenfosforečnan hořečnatý/ horečnatý, chlorid cholinu / cholín chloridu, olej z *Mortierella alpina*, citronan/citran sodný, uhličitan vápenatý, emulgátor (**sójový** lecitin/ lecitín), chlorid sodný, kyselina L-askorbová, L-askorban sodný, inositol/inozitol, L-tryptofan/ L-tryptofán, chlorid hořečnatý/horečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý/zinočnatý, L-karnitin/L-karnitín, DL-α-tokoferyl-acetát, antioxidant (askorbylpalmitát), D-pantothenát/ pantotenát vápenatý, nikotinamid/nikotínamid, síran měďnatý/meďnatý, thiamin/tiamín hydrochlorid, retinylpalmitát, riboflavin/riboflavín, pyridoxin/pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová/pteroylmonoglutámová (kyselina listová), jodid draselný, síran manganatý/mangánatý, seleničitan sodný, fytomenadion/fytomenadión, cholekalciferol, D-biotin/D-biotín, kyanokobalamin/kyanokobalamín.

Složení se vztahuje/zloženie sa vzťahuje k současnému stavu potraviny.

Důležité upozornění / Dôležité upozornenie

Kojení je nejlepším způsobem výživy kojenců. Potravina pro zvláštní výživu kojenců starších 6 měsíců. **Nutrilon® 2** má být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy, nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoli výjimky z pravidla věku 6 měsíců, by mělo být přijímáno jen na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a rozvojových potřebách konkrétního kojence. Pro zdraví kojenců je důležité dodržovat návod na přípravu a uvedená doporučení.

Podporujeme doporučení WHO – plné kojení v prvních 6 měs. věku a pokračování až do 2 let a dále, spolu se zaváděním bezpečné a vhodné doplňkové stravy.

Dojčenie je najlepším spôsobom výživy dojčiat. Potravina na výživu dojčiat starších ako 6 mesiacov. **Nutrilon® 2** má byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa a nemá sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Rozhodnutie o začatí podávania príkrmov, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla veku 6 mesiacov, by malo byť prijímané iba na základe rady nezávislých osôb kvalifikovaných v lekárstve, výžive alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa, a to v závislosti na individuálnom raste a vývojových potrebách konkrétneho dojčaťa. Pre zdravie dojčiat je dôležité dôsledne dodržiavať návod na prípravu a uvedené odporúčania.

Podporujeme odporúčanie WHO – plné dojčenie v prvých 6 mes. veku a pokračovanie až do 2 rokov a ďalej, spolu so zavádzaním bezpečnej a vhodnej doplnkovej stravy.