

## Písomná informácia pre používateľa

**Meteospasmyl**  
60 mg/300 mg mäkké kapsuly

alveríniumcitrát/simetikón

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

### V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Meteospasmyl a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Meteospasmyl
3. Ako užívať Meteospasmyl
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Meteospasmyl
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### 1. Čo je Meteospasmyl a na čo sa používa

Meteospasmyl je kombinovaný liek obsahujúci alveríniumcitrát, látku tlmiacu bolestivé stňahy čreva a simetikón, ktorý pôsobí pri nadúvaní a plytnatosti. Po užití ústami vytvorí simetikón ochranný film na črevnej sliznici a alverín postupne zmierni napätie črevnej steny.

Meteospasmyl sa užíva na liečbu príznakov funkčných črevných porúch (najmä dráždivého hrubého čreva), ktoré sa prejavujú bolesťami brucha, až bolestivými kŕčmi, nadúvaním, črevnou plytnatost'ou, prípadne nutkavou hnačkou striedajúcou sa so zápchou.

Meteospasmyl je určený iba na liečbu dospelých pacientov.

#### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Meteospasmyl

##### Neužívajte Meteospasmyl

- ak ste alergický na alveríniumcitrát, simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak vám lekár povedal, že máte nepriehodnosť čriev.

Meteospasmyl sa nesmie podávať det'om a dospevajúcim vo veku do 18 rokov.

##### Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Meteospasmyl, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tiež sa obráťte na svojho lekára, ak vaše príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo máte dlhodobú zápchu.

Meteospasmyl môže zvyšovať hladinu pečeňových enzýmov v krvi (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“). Počas liečby môže lekár vykonať krvné vyšetrenie, aby skontroloval stav vašej pečene. V prípade zvýšených hladín pečeňových enzýmov môže lekár rozhodnúť ukončiť liečbu.

### **Iné lieky a Meteospasmyl**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri užívaní Meteospasmylu môže byť ovplyvnené vstrebávanie niektorých liekov.

### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Meteospasmyl neužívajte počas tehotenstva ani v období dojčenia.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Meteospasmyl má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri jeho užívaní sa však môže vyskytnúť závrat, ktorý môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

## **3. Ako užívať Meteospasmyl**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Veľkosť dávky a dobu užívania Meteospasmylu určuje lekár. Ak neodporučí inak, dospelí užívajú zvyčajne 1 kapsulu 2 – 3-krát denne.

Kapsuly sa užívajú pred jedlom, prehľtajú sa nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (perorálne použitie).

### **Ak užijete viac Meteospasmylu, ako máte**

Pri dávkach prekračujúcich odporúčanú dávku sa môže objaviť nevoľnosť, vracanie a pokles krvného tlaku. Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte zdravotníčku pohotovosť. Zoberte si so sebou zvyšné kapsuly, ktoré vám ešte zostali.

### **Ak zabudnete užiť Meteospasmyl**

Ak zabudnete užiť dávku lieku v naplánovanom čase, užite ju ihneď ako si spomeniete. Pokiaľ sa už blíži čas nasledujúcej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v odporúčanom dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akokoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, ihneď o tom informujte lekára:

- príznaky závažnej alergickej reakcie, najmä opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehľtaním, vyrážku, svrbenie, ťažký závrat sprevádzaný zrýchleným srdcovým rytmom a výrazným potením (závažná alergická reakcia je veľmi zriedkavá, môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb);

- príznaky naznačujúce poruchu funkcie pečene, medzi ktoré môže patríť zožltnutie pokožky alebo očných bielok, tmavo sfarbený moč, strata chuti do jedla, nevoľnosť alebo vracanie (porucha funkcie pečene je veľmi zriedkavá, môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb).

#### **Neznáme vedľajšie účinky** (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- bolest' hlavy,
- závrat,
- nevoľnosť,
- vyrážka,
- žihľavka,
- svrbenie,
- zvýšenie hladín pečeňových enzymov (transamináz, alkalických fosfatáz) a bilirubínu (žlčové farbivo) v krvi (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

#### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

### **5. Ako uchovávať Meteospasmyl**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vziahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

#### **Čo Meteospasmyl obsahuje**

- Liečivami sú alverínumcitrát a simetikón. Jedna mäkká kapsula obsahuje 60 mg alverínumcitrátu a 300 mg simetikónu.
- Ďalšie zložky sú: želatína, glycerol a oxid titaničitý (E171).

#### **Ako vyzerá Meteospasmyl a obsah balenia**

Meteospasmyl sú mäkké želatínové biele kapsuly obsahujúce bielu nepriehľadnú masu. Dodávajú sa v blistrovom balení po 20 kapsúl.

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

Laboratoires Mayoly Spindler, 6 Avenue de l'Europe - B.P. 51, 78401 Chatou Cedex, Francúzsko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2019.**