

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ambrobene 30 mg
(ambroxoli hydrochloridum)
tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Zloženie tablety:

Liečivo:

ambroxoli hydrochloridum (ambroxoliniumchlorid) 30 mg v 1 tablete.

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amyllum (kukuričný škrob), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý).

Farmakoterapeutická skupina:

Expektorans, mukolytikum.

Charakteristika:

Ambrobene 30 mg je expektorans s mukolytickým účinkom, vyvoláva zvýšenú tvorbu hlienu a zároveň ho zrieduje, podporuje pohyb riasiniek a tým čistí sliznicu dýchacích ciest, zvyšuje jej odolnosť proti infekcii.

Indikácie:

Liek Ambrobene 30 mg sa užíva pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest spojených s ťažkým vykašliavaním, pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest, pri akútnych a chronických zápaloch prínosových dutín. Ambrobene 30 mg možno podávať deťom i dospelým.

Kontraindikácie:

Liek Ambrobene 30 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na ambroxol.

Počas tehotenstva užívajte liek len s vedomím lekára. Počas užívania lieku Ambrobene 30 mg sa odporúča prerušiť dojčenie.

Nežiaduce účinky:

Počas užívania lieku Ambrobene 30 mg sa môže prejaviť slabosť, bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, hnačky a dávenie, kožné vyrážky. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte svojho ošetrojúceho lekára.

Interakcie:

Účinky lieku Ambrobene 30 mg a iných liekov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. V prípade, že užívate iné lieky na lekárske predpis alebo i bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívať Ambrobene 30 mg s lekárom. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Ambrobene 30 mg.

Látky tlmiace kašeľ (napr. kodeín) bránia vykašľávať hlien, ktorý sa po podaní Ambrobene 30 mg tvorí vo väčšej miere, preto ich neužívajte súčasne.

Dávkovanie:

Pokiaľ lekár neurčí inak, zvyčajná dávka Ambrobene 30 mg je nasledovná:

Dospelí a deti nad 12 rokov: prvé 2 - 3 dni: 3 x 1 tableta denne, ďalej 2 x 1 tableta denne.

Deti od 6 - 12 rokov: 2 - 3 x 1/2 tablety denne.

Spôsob užívania:

Liek sa užíva po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny, čo významne prispieva k jeho účinku.

Upozornenie:

V prípade, že počas troch dní nedôjde k zlepšeniu stavu, vyhľadajte svojho ošetrojúceho lekára. Bežným sprievodným javom počas užívania lieku Ambrobene 30 mg je zvýšenie tvorby hlienu v prvých 2 - 3 dňoch.

Zvyčajný čas liečby liekom Ambrobene 30 mg je 7 - 10 dní.

Uchovávanie:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.

Varovanie:

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajúte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie:

20 tabliet.

Dátum poslednej revízie:

Marec 2008