

Písomná informácia pre používateľa

Pikovit sirup

multivitamínový sirup pre deti
zmes vitamínov

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Pikovit a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pikovit
3. Ako užívať Pikovit
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Pikovit
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Pikovit a na čo sa používa

Pikovit sirup obsahuje 9 najdôležitejších vitamínov, ktoré riadia celý rad biochemických pochodov v organizme. Vitamíny skupiny B (B₁, B₂, B₆, B₁₂, kyselina pantoténová a nicotínamid) sa zúčastňujú metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín a taktiež sa zúčastňujú na činnosti nervového systému. Vitamín A je potrebný na obnovu výstelkových buniek a na tvorbu zrkového pigmentu. Vitamín D reguluje ukladanie vápnika, a preto podporuje správnu mineralizáciu kostí a zubov. Vitamín C urýchľuje vstrebávanie železa a zúčastňuje sa mnohých oxidačno-redukčných procesov v organizme.

Pikovit sirup pokrýva zvýšenú potrebu vitamínov v detskom organizme a nahrádza ich nedostatok v strave.

Pikovit sirup je určený predovšetkým deťom:

- pri nechutenstve,
- pri zvýšenej únave školákov,
- pri spomalenom raste,
- ako doplnok antibiotickej liečby,
- ako vitamínový doplnok stravy, najmä v zimných a jarných mesiacoch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pikovit

Neužívajte Pikovit:

ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Pikovit sirup nesmú užívať deti, ktoré majú hypervitaminózu A a D.

Deti mladšie ako 1 rok môžu užívať Pikovit sirup len na odporúčanie lekára a pod jeho kontrolou.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať **Pikovit**, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti nesmú užívať vyššie dávky, ako sú odporúčané. Užívanie veľmi vysokých dávok po dlhú dobu môže spôsobiť hypervitaminózu A a D, i keď riziko predávkovania Pikovit sirupom je minimálne.

Predtým, ako začnete súbežne užívať iné prípravky s obsahom vitamínov, vitamínov a minerálov a/alebo minerálov, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a Pikovit

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Dávky vitamínov v sirupe Pikovit sú určené deťom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pikovit sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pikovit sirup obsahuje cukor

Každá čajová lyžička (5 ml) tohto lieku obsahuje 3 g cukru (čo predstavuje dennú dávku cukru od 6 do 12 g (10-20 ml sirupu), a preto sa neodporúča podávať diabetikom.

Ak vám alebo vášmu dieťaťu lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte lekára pred užitím tohto lieku.

Pikovit sirup obsahuje benzoan sodný (E 211). Kyselina benzoová slabo dráždi kožu, oči a sliznice. Môže zvýšiť riziko vzniku žltacky u dojčiat a novorodencov.

Pikovit sirup obsahuje farbivo košenilovú červeň (E 124), ktoré môže vyvolať alergické reakcie vrátane astmy. Alergické reakcie sú častejšie u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú.

3. Ako užívať Pikovit

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Deti od 1 do 3 rokov užívajú 1 čajovú lyžičku sirupu (5 ml) 2-krát denne.

Deti od 4 do 6 rokov užívajú 1 čajovú lyžičku sirupu (5 ml) 3-krát denne.

Deti od 7 do 14 rokov užívajú 1 čajovú lyžičku sirupu (5 ml) 3 až 4-krát denne.

Pikovit sirup sa má užívať po jedle. Podávajte ho čajovou lyžičkou alebo ho vmiešajte do čaju, džúsu alebo do potlačeného ovocia.

Pri nechutenstve sa má Pikovit sirup užívať 1 mesiac a pri ostatných indikáciách po dobu, ako je potrebné.

Ak užijete viac Pikovitu, ako máte

Vždy užívajte Pikovit sirup tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii. Užívanie veľmi vysokých dávok vitamínov po dlhú dobu môže spôsobiť hypervitaminózu A a D, i keď možnosť predávkovania je pre nízky obsah vitamínov minimálna.

Ak zabudnete užiť Pikovit

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- reakcie z precitlivenosti.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na [národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V](#).

5. Ako uchovávať Pikovit

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Po otvorení fľašky sa môže sirup užívať po dobu 2 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Pikovit obsahuje

- Liečivá sú: retinol (vitamín A), cholekalciferol (vitamín D₃), kyselina askorbová (vitamín C), monohydrát tiamíniumdichloridu (vitamín B₁), riboflavín (vitamín B₂), pyridoxíniumchlorid (vitamín B₆), kobalamín (vitamín B₁₂), nikotínamid, dexpantenol.
5 ml sirupu (1 čajová lyžička) obsahuje 900 IU (medzinárodných jednotiek) retinolu; 100 IU cholekalciferolu; 50 mg kyseliny askorbovej; 1 mg monohydrátu tiamíniumdichloridu; 1 mg riboflavínu; 0,60 mg pyridoxíniumchloridu; 1 µg kobalamínu; 5 mg nikotínamidu a 2 mg dexpantenolu.
- Ďalšie zložky sú: agar, tragant, sacharóza, roztok glukózy, pomarančová aróma, grapefruitová aróma, polysorbát 80, monohydrát kyseliny citrónovej, košenilová červeň (ponso 4R) (E124), benzoan sodný (E 211), čistená voda.

Ako vyzerá Pikovit a obsah balenia

Pikovit sirup je husto viskózna slabožltá až hnedkasto-oranžová tekutina so slabo viditeľnými zrnčkami. Má mierne kyslastú chuť a príjemnú vôňu.

Sklenená fľaša so 150 ml sirupu s plastovým uzáverom je vložená v papierovej škatuľke s písomnou informáciou.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, info.sk@krka.biz

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2019.