

## Písomná informácia pre používateľa

### neo-angin bez cukru tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru
3. Ako užívať neo-angin bez cukru
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### **1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa**

neo-angin bez cukru je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.

Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie a opuch.

### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru**

#### **Neužívajte neo-angin bez cukru**

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

#### **Upozornenia a opatrenia**

neo-angin bez cukru obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ).

Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

#### **Iné lieky a neo-angin bez cukru**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.

### **neo-angin bez cukru a jedlo a nápoje**

neo-angin bez cukru sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.

### **neo-angin bez cukru obsahuje izomalt a farbivo košenilovú červenú A**

neo-angin bez cukru obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

neo-angin bez cukru obsahuje farbivo košenilovú červenú A, ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

## **3. Ako užívať neo-angin bez cukru**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riad'te sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny.

Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

### **Dĺžka liečby**

Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

### **Ak užijete viac neo-anginu bez cukru, ako máte**

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.

### **Ak zabudnete užiť neo-angin bez cukru**

Ak ste zabudli užiť neo-angin bez cukru, alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užití neo-anginu bez cukru sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme:

- alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté:	môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
--------------	--------------------------------------

Časté:	môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté:	môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé:	môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
Veľmi zriedkavé:	môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme:	častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

### Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## 5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru

Tento liek uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.  
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.  
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

### Čo neo-angin bez cukru obsahuje

#### Liečivá sú:

dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,72 mg

#### Ďalšie zložky sú:

silica anízovca pravého, silica maty piepornej, košenilová červená A (E 124), izomalt, kyselina vínna.

### Ako vyzerá neo-angin bez cukru a obsah balenia

Červené, okrúhle, čiastočne priehľadné pastilky.  
Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.

### Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH  
Motzener Strasse 41  
D-12277 Berlín  
Nemecko

### Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2016.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.  
Kocel'ova 17  
Bratislava 2, 821 08  
Slovenská republika

Tel. č: 02/5557 1182  
Fax: 02/5556 9016  
e-mail: [pharmacovigilance@4lifepharma.eu](mailto:pharmacovigilance@4lifepharma.eu)