

## **PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA**

Prosím čítajte pozorne!

### **ROWATINEX mäkké kapsuly**

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:**

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Írsko

#### **Zloženie:**

##### **1 mäkká kapsula obsahuje:**

*Liečivo:* alfa-pinén 24,8 mg; beta-pinén 6,2 mg; kamfén 15,0 mg; cineol 3,0 mg; fenchón 4,0 mg; borneol 10,0 mg; anetol 4,0 mg

*Pomocné látky:* olivový olej, želatína, glycerol 85 %, sodná soľ etylparabénu (E215), sodná soľ propylparabénu (E217), žlt' SY (E110), chinolínová žltá (E104).

#### **Farmakoterapeutická skupina:**

fytofarmakum-diuretikum a spazmolytikum

#### **Charakteristika:**

ROWATINEX zvyšuje sekréciu moču, uvoľňuje kŕče močových ciest a tým podporuje vylučovanie kameňov. Vyváženou kombináciou terpénov sa zlepšuje prekrvenie obličiek a zvyšuje sa vylučovanie málo koncentrovaného moču, čím sa tlmí zápal močových ciest.

#### **Indikácie:**

ROWATINEX sa odporúča na liečbu ochorení močových ciest a zápalov obličiek a močových ciest. Zmierňuje a uvoľňuje kŕče močových ciest, podporuje rozpúšťanie a vylučovanie obličkových a močových kameňov. Preventívne pôsobí proti tvorbe nových kameňov.

#### **Kontraindikácie:**

Nie sú známe.

#### **Nežiaduce účinky:**

Nie sú známe žiadne závažné vedľajšie nežiaduce účinky. Ojedinele môže dôjsť k nepatrným a prechodným žalúdočným ťažkostiam. Ak sa však vyskytnú akékoľvek nežiaduce príznaky či neobvyklé reakcie počas liečby je potrebné informovať lekára

#### **Tehotenstvo a dojčenie:**

Hoci doteraz nebol pozorovaný negatívny účinok na plod, Rowatinox sa nemá užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Tak isto sa neodporúča dojčiacim ženám.

#### **Interakcie s inými liekmi:**

Obozretnosť v dávkovaní je potrebná u pacientov užívajúcich lieky na zníženie krvnej zrážanlivosti alebo lieky, ktoré sa metabolizujú a vylučujú cez pečeň.

#### **Dávkovanie, spôsob a dĺžka použitia:**

**Dospelí:** Obvykle sa užíva 1 až 2 mäkké kapsuly 3 krát denne pred jedlom.

**Deti 6 –14 ročné:** Obvykle sa užíva 1 mäkká kapsula 1 až 2 krát denne pred jedlom.

Kapsuly prehltnúť nerozhryzené a zapíť tekutinou.

#### **Uchovávanie:**

Uchovávajú sa pri teplote do 25 °C v dobre uzatvorenom obale.

#### **Varovanie:**

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obaloch (dátum expirácie/EXP).  
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

**Balenie:** 1 x 20 mäkkých kapsúl  
1 x 50 mäkkých kapsúl  
1 x 100 mäkkých kapsúl

**Dátum poslednej revízie:**  
Marec 2013